



MANUAL DE USO DE PURINES Y SUEROS EN LA AGRICULTURA

Para más información, dirigirse a las Agencias de Extensión Agraria y COAG-Canarias:

Jefatura del Servicio de Extensión Agraria
Ctra. Gral del Norte, Km. 7,2 - Cardones (Arucas). 928 21 96 24

Agencia de Extensión Agraria de Teror
Avda. del Cabildo Insular, 151-B (Teror). 928 61 40 92

Agencia de Extensión agraria de Santa Brígida
C/ Circunvalación, 14 (Santa Brígida). 928 64 51 62

Agencia de Extensión Agraria de Telde
C/ León y Castillo, nº 8 (Telde). 928 69 24 51

Agencia de Extensión Agraria de Sardina del Sur
C/ Princesa Guayarmina, 1 (Sta Lucía de Tirajana). 928 75 10 94

Agencia de Extensión Agraria de La Aldea de San Nicolás
C/ Federico Rguez. Gil, nº 14 (La Aldea). 928 88 40 09

Agencia de Extensión Agraria de Gáldar
C/ Andamana s/n, 1^a (Gáldar). 928 88 05 86

COAG-Canarias: 928 36 98 06



Utilizados correctamente son unos fertilizantes muy beneficiosos para cualquier cultivo en Gran Canaria, reducimos costes y mejoramos la calidad de las producciones.



Transporte

Para transportar los purines o sueros de queserías sólo es necesario que vaya en envases cerrados. Pueden valer garrafas o bidones de 5, 10, 20 litros, etc o los prácticos depósitos cuadrados de 1.000 litros que pueden llevarse en pequeñas camionetas o *pick up*.



No es necesario tener ninguna licencia ni permiso especial, a menos que se transporte en un vehículo de más de 2.000 kg (PMA), en cuyo caso para transportarlos sí se debe solicitar una tarjeta de transporte al Cabildo.

Almacenaje

Mantenerlo a la sombra y que pueda transpirar (no dejarlo cerrado herméticamente).

Modo de uso

Siempre rebajado con agua.

Aplicación

Goteo, aspersión, fumigación.

Cultivos

Cualquier cultivo.



SIEMPRE SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DE LOS TÉCNICOS

DOSIS ORIENTATIVA DE RIEGO

Purines

- » Aspersión: 30 - 100 litros / 1.000 m².
- » Goteo: 3-10 cc / gotero.
- » Fumigación: 5 % (50 cc/litro).

Suero (tabefe o tabique). Siempre de queserías donde se aplique sal al queso y **no** a la leche.

- » Aspersión: 15 - 40 litros / 1.000 m².
- » Goteo: 3-6 cc / gotero.
- » Fumigación: 5 % (50 cc/litro).



Composiciones orientativas de los purines y sueros:

	Purín de cochino/vaca		Suero de cabra/vaca	
pH	8,1	8,7	3,6	4,0
Conductividad (ds/m)	14,2	39,7	8,43	6,63
Nitrógeno total (g/L)	0,2	0,35	1,5	1,3
Fósforo (P2O5, g/L)	1,1	0,15	6,1	3,7
Potasio (K2O, g/L)	6,3	15,7	1,6	3,9
Calcio (CaO), g/L	0,6	0,1	0,8	0,5
Magnesio (MgO, g/L)	0,1	0,4	0,3	0,1
Azufre (S, g/L)	0,1	0,65	0,2	0,1
Sodio (Na, g/L)	0,6	0,55	0,6	0,4
Materia orgánica (g/L)	2,6	13,65	29,4	45,8

Nicolás Navarro Guerra del Río (Cabildo de Gran Canaria)

David Nuez Arbelo (COAG-CANARIAS)