



Cabildo de Gran Canaria

AGRICULTURA
www.grancanaria.com

VIROSIS DEL TOMATE

Diferenciación de síntomas de los últimos virus introducidos en Gran Canaria.

Divulgación técnica del Laboratorio de Fitopatología. Granja Agrícola Experimental

La enfermedad del rizado amarillo del tomate (TYLCD). Virus de la cuchara



Hojas enrolladas hacia el haz (imbricado): "cuchara"



Plantas achaparradas



Vector *Bemisia tabaci*



Pecíolo de la hoja curvado

Tomato chlorosis virus (ToCV)



Amarilleo generalizado de la base de las plantas



Clorosis internervial morada




Vectores del ToCV *Trialeurodes vaporariorum* y *Bemisia tabaci*



Clorosis internervial amarilla

El virus del mosaico del pepino dulce o PepMV (Pepino Mosaic Virus)



A veces, marchitez de plantas por zonas (muerte súbita)



Falta de médula en los tallos



Amarillo internerval mas acentuado en la base del foliolo. Decoloración morada de los foliolos



Maduración irregular

PepMV. Transmisión mecánica, restos vegetales del suelo, por semilla no esta bien demostrado

VIRUS DEL TORRADO (*Tomato torrado virus – ToTV*)



Amarilleo y necrosis en la base de los foliolos



Necrosis en cremallera del peciolo



Brote quemado



Necrosis en cremallera del fruto



Tomates deformados con semillas a la vista



Foliolo del tomate con infección de *Trialeurodes vaporariorum*, vector



Cabildo de Gran Canaria

AGRICULTURA
www.grancanaria.com

Es una publicación del Cabildo de Gran Canaria